

Az Elipse™ ballonos súlycsökkentő program **BEHELYEZÉS NAPJA**

ELŐTTE

Szedje az orvosa által felírt
gyógyszereket.

Ajánlatos, hogy felelős felnőtt tudja
ellenőrizni Önt néhány
napig a behelyezés után.*

FELKÉSZÍTÉS

Jelentkezzen be a recepción
15 perccel korábban.

Keresse meg orvosát

FELTÖLTÉS


A kapszula feloldódik
a gyomorban.

Megkezdődik a feltöltés a folyadékkal

ELINDULÁS

Vegye át a csatlakoztatott mérleget, és állítsa
be az Allurion okostelefon alkalmazást.

Az orvos jóváhagyását követően térjen
vissza mindennapi tevékenységeihez.



REGGEL

Szedje be az orvosa által
felírt gyógyszereket.

A behelyezés előtt 8 órán
át ne egyen.

BEHELYEZÉS

Nyelje le a kapszulát.
Orvosa segíthet ebben.

Röntgenen erősítse meg a
kapszula megfelelő
elhelyezését.

LEVÁLASZTÁS

A katétert finoman kell
kihúzni a szájból.



* Az Elipse eszközzel végzett kezelés alatt a páciensnek biztosítania kell, hogy súlyos komplikációk fellépése esetén korszerű sürgősségi ellátáshoz tudjon hozzájutni.

Ez az orvostechnikai eszköz szabályozás alá eső egészségügyi termék, ami az európai rendeletek alapján a CE jelölést viseli. Az Elipse ballon ideiglenes súlycsökkentést elősegítő eszköz 18 éven felüli túlsúlyos vagy elhízott felnőttek számára, akiknek a testtömeg indexe (BMI) ≥ 27 . Az Elipse ballont kizárólag olyan egészségügyi szakember vezetheti be, aki ismeri az Elipse ballon használatát. Az Elipse ballont felügyelt táplálkozási és viselkedés-módosítási program mellett kell használni. Bizonyos személyek nem feltétlenül alkalmasak az Elipse ballon használatára. Az Ön orvosa részletes kórelőzmény és fizikai vizsgálat alapján állapítja meg az Ön alkalmasságát. Fontos, hogy teljes és pontos kórelőzményt adjon az orvosának. Ritka esetekben az Elipse ballon eltávolításához endoszkópos vagy műtéti beavatkozásra lehet szükség.

Beszélje meg orvosával, hogy megfelel-e Önnek az Elipse program. További információkat a www.allurion.com oldalon találhat.